

District Pest Management Plan (DPMP)

Paddy (2017-2018)

Sl.No.	Date of Dissemination	Message
1	06-06-2017	విత్తనశుద్ధి: విత్తనం మరియు నేల ద్వారా వ్యాపించే తెగుళ్ళ నివారణకు కిలో విత్తనానికి 10 గ్రా. ట్రైకోడర్మా/సూడ్-మొనాస్ తో కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి.
2	20-06-2017	నారుమడి లో కలుపు నివారణకు బ్యూటాక్లోర్ 50 మి.లీ. లేదా ప్రెటిలాక్లోర్ + సేఫనర్ 25 మి.లీ. ఏదైనా ఒక దానిని ఎకరానికి సరిపడే నారుమడికి 5 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తన 8-10 రోజులకు పిచికారి చేసుకొనవలెను.
3	29-06-2017	ధీర్ఘకాలిక వరి వంగడాలు నారు పోసుకునే సమయం దాటిపోయింది. రైతులు మధ్యకాలిక రకాలైన సోమనాథ్ (డబ్ల్యూజీఎల్-347), వరంగల్ సన్నలు (డబ్ల్యూజీఎల్-32100), పొలాస ప్రభ (జేజీఎల్-384), విజేత (ఎంటీయు-1001) లను జూలై 10వ తేదీలోపు నారు పోసుకుంటే అధిక దిగుబడులను సాధించవచ్చు.
4	29-06-2017	వరిలో విత్తనశుద్ధి పాటించాలి. పొడి విత్తనశుద్ధికి 1 కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. కార్బెండజిమ్ లేదా తడి వత్తనశుద్ధికి 1 కిలో విత్తనానికి 1 గ్రా. కార్బెండజిమ్ తో విత్తనశుద్ధి చేయాలి.
5	19-07-2017	ఎకరాకు సరిపోవు నారుమడికి 800గ్రా.కార్బోఫూరాన్ 3జి గుళికలు నారు తీయుటకు వారం రోజుల ముందు వాడాలి
6	19-07-2017	నాట్లు వేయుచున్న రైతులు ప్రతి రెండు మీటర్ల నాటుకు ఒక అడుగు కాలి బాటలను వదలాలి.
7	24-07-2017	వరి నాట్లు వేసే రైతులు విధిగా ఎకరాకు 20 కిలోల జింకు సల్ఫేటు దుక్కిలో వేయవలెను.కాంప్లెక్స్ ఎరువులతో జింకును కలిపి వాడరాదు.
8	24-07-2017	సకాలంలో నాట్లు పూర్తిచేయవలెను
9	24-07-2017	నాట్లు వేసిన 3 నుండి 5 రోజులలో ఎకరాకు ఒక లీటరు బ్యూటాక్లోర్ లేదా అర లీటరు ప్రెటిల్లాక్లోర్ 20 కిలోల ఇసుకలో కలిపి చల్లవలెను
10	08-08-2017	నాట్లు కొనసాగుచున్నవి. స్వల్ప కాలిక రకాలను మాత్రమే ఈ నెల చివరి వరకు నాటవచ్చు
11	08-08-2017	కాండము తొలుచు పురుగు నివారణకు 3జి లేదా 4జి గుళికలను 10/8 కిలోల మోతాదులో ఎకరాకు వాడాలి

District Pest Management Plan (DPMP)

12	08-08-2017	నాట్లు వేసి 15 నుండి 20 రోజులు గడిచిన ఎడల బిస్పెరిబాక్ సోడియం 100 మి.లీ. ఎకరానికి పిచికారి చేసి వెడల్పాకు మరియు సన్నని ఆకు కలుపును నివారించుకోవచ్చు
13	08-08-2017	గట్ల వెంట పెరిగే కలుపును వెంటవెంటనే తొలగించాలి
14	21-08-2017	పైపాటుగా వరిలో 35 కిలోలకు మించకుండా యూరియాను బురద పదనులో చల్లాలి. చల్లిన 24 గంటల తరువాత నీరు పెట్టాలి
15	21-08-2017	జింకు లోప నివారణకు 400 గ్రాముల జింకు సల్ఫేటు ఎకరమునకు వారము వ్యవధితో రెండు సార్లు పిచికారి చేయాలి
16	28-08-2017	వరిలో పచ్చ కొమ్ము పురుగు ఆశించినది. నివారణకు క్విన్లఫాస్ ఎకరానికి 400 మి.లీ. లేదా క్లోర్పైరిఫాస్ 20 ఇ. సి. ఎకరానికి 500 మి.లీ. పిచికారి చేయాలి. పై మందులతో కాండము తొలుచు పురుగును కూడా అదుపులో ఉంచవచ్చు.
17	28-08-2017	కాండము తొలుచు పురుగు నష్టము 10 శాతమునకు మించినచో లేదా కుదురుకు ఒక గ్రుడ్ల సముదాయము గమనించిన ఎడల కార్బాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 400 గ్రాములు ఒక ఎకరమునకు పిచికారి చేయవలెను
18	04-09-2017	వరిలో ఆకు నల్లి: ఆకులపై చిన్న తెలుపు మచ్చలు ఏర్పడి క్రమేపి ఎరుపు రంగుకి మారి దూరం నుండి పొలం ఎండి పోయినట్లు కనిపిస్తే నివారణగా నీటిలో కరిగే గంధకం 3 గ్రా. లేదా డైకోఫాల్ 5 మి. లీ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
19	11-09-2017	మొగి పురుగు నివారణకు ట్రైకోగ్రామ గుడ్డు పరాన్నజీవి ఎకరానికి 20,000 చొప్పున వదలాలి. కార్బాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఎకరానికి 400 చొప్పున పిచికారి చేయాలి.
20	18-09-2017	జింకు లోప నివారణకు ఎకరాకు 400 గ్రాముల జింకు సల్ఫేటు పిచికారి చేయాలి. ఆకు మచ్చ తెగులు నివారణకు మాంకోజెబ్-M 45ఎకరాకు 400 గ్రాములు పించ్చకారి చేయాలి
21	02-10-2017	సుడి దోమ:- సన్న రకాలకు సుడి దోమ అశించింది. నివారణకు నీటి మట్టము తగ్గించాలి. పాయలు ఏర్పాటు చేయాలి. మొదళ్ళపై పడునట్లు డిడివిపి 100 మి.లీ.+ఎసిఫేట్ 350 గ్రాములు లేదా ఎథోఫెస్ ప్రాక్స్ 400మి.లీ. లేదా కొత్త మందు పైమెట్రోజైన్ (ఛెస్) ఐతే 120 గ్రాములు పిచికారి చేయాలి.
22	09-10-2017	వరి పైరులో కంకి నల్లి మరియు గింజ మచ్చ ఆశించింది .నివారణకు ప్రొఫెనోఫాస్ 400మి. లీ . ప్రొపిక్లొనజోల్ 250 మి. లీ. కలిపి పిచికారి

District Pest Management Plan (DPMP)

		చేయాలి
23	16-10-2017	వరి గింజ మచ్చ తెగులు ఆశించినది. నివారణకు స్పైరోమెసిఫెస్ @ 250 మి.లీ. ఎకరానికి + ప్రోపికోనజోల్ 250 మి.లీ. కలిపి సాయంత్రం వేలలో పిచికారి చేయాలి.
24	23-10-2017	సుడిదోమ నివారణకు డైనేటాఫ్యూరాన్(టోకెన్/ఓపిస్) ఎకరానికి 80 గ్రా. లేదా పైమెట్రోజైన్ (చెస్) ఎకరానికి 120 గ్రా. వరి మొక్కల మొదళ్ళపై పొలంలో నీటిని తీసి పిచికారి చేయాలి.
25	06-11-2017	మెడవిరుపు తెగులు నివారణకు 120 గ్రా. ట్రైసైక్లాజోల్ లేదా 400 మి.లీ. ఐసోప్రోథయోలేన్ ఎకరాకు వాడాలి.
26	07-11-2017	ఆలస్యంగా నాట్లు వేసిన చోట దోమ పోటు ఆశించినది .నివారణకు దగ్గరగా పాయలు తొక్కి నీటి మట్టము తగ్గించి మొక్క మొదళ్ళపై పడు విధముగా ఈ దిగువ మందులను పిచికారి చేయాలి . 1 . డైక్లోరోవాస్ 200 మి.లీ + అసిఫేట్ 500 గ్రాములు కలిపి మొక్క మొదళ్ళపై పడు విధముగా మందులను పిచికారి చేయాలి 2 . పైమెట్రోజాయిన్ 120 గ్రాములు కలిపి మొక్క మొదళ్ళపై పడు విధముగా మందులను పిచికారి చేయాలి
27	13-11-2017	కోతలకు సిద్ధము గా ఉన్నది. ఈ దశలో పాయలు చేసి నీటి మట్టము తగ్గించాలి. రెల్ల రాల్చు పురుగు నివారణకు క్లోరిపైరిఫాస్-20 ఈసీ 600 మిలి + 200 మిలి డిడివిపి కలిపి ఎకరాకు సాయంత్రపు సమయములో పిచికారి చేయాలి. యాసంగి వరి నార్లు అనురాధ కార్తి నవంబరు 20 నుండి పోసుకోవాలి
28	20-11-2017	ఇప్పుడు వరి నార్లు వేసుకోవచ్చు. బతుకమ్మ, కూనారం సన్నాలు, యం. టి. యు.-1010 వంటి రకాలను వేసుకోవచ్చు. తెలంగాణ సోనా రకాన్ని డిసెంబర్ 10 తదుపరి నార్లు పోసుకోవాలి. విత్తనానికి ఒక కిలో కు 10 మీ.లీ. సూడోమోనాస్ తో విత్తన శుద్ధి చేయాలి
29	27-11-2017	బతుకమ్మ, కూనారం సన్నాలు ఐ.ఆర్ 64, లేదా MTU-1010 రకాల నార్లు వేసుకోవచ్చు. విత్తనశుద్ధి కార్బెండజిమ్ కిలో విత్తనానికి ఒక గ్రాము చొప్పున కలపాలి. తెలంగాణ సోనా రకాన్ని డిసెంబర్ 10 తదుపరి నార్లు పోయాలి. ఈ రబి కాలములో జింక్ సల్ఫేట్ నారుమడి అడుగులో ఒక కిలో వేయాలి
30	04-12-2017	విత్తనాన్ని 30 గ్రాముల కార్బెండజిమ్-50 తో శుద్ధి చేసి నారు మళ్లు

District Pest Management Plan (DPMP)

		వేయాలి. ఒక కిలో జింక్ అడుగున వేయాలి. ఒక బండెడు పసుపుల ఎరువు వేస్తే చలిని తట్టుకుంటుంది. అడుగున 6 కిలోల సూపర్ వేయండి. సూపర్ మరియు జింక్ కలపరాదు.
31	18-12-2017	ఎకరాకు సరిపోవు నారుమడికి ఒక కిలో కార్బోఫ్యూరాన్ -3 జి గుళికలు తప్పనిసరిగా వాడాలి
32	26-12-2017	చలి అధికంగా ఉన్నందున, నారు మడులు పసుపు వర్ణము లోకి మారి ఎర్ర బారు తున్నాయి. అధిగమించుటకు జింక్ సల్ఫేట్ 2 గ్రాములు మరియు 19 -19 -19 ఎరువును 10 గ్రాములు కలిపి పిచికారీ చేయాలి.. ఉదయపు బావి లేదా బోరు బావి గోరు వెచ్చని నీటి ని పారించాలి
33	04-01-2018	వరి నారు కట్టలను సూడోమోనాస్ 5 గ్రాములు లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపిన ద్రావణములో అర గంట సేపు నాన బెట్టి నాటుకొవాలి. ప్రతి 2 మీటర్ల నాటుకు ఒక అడుగు కాళి బాటలు వదలాలి.
34	11-01-2018	నాటు పూర్తి అయిన 3 రోజుల లోపు ప్రేటిలాక్టోర్ కలుపుమందు అర లీటర్ ఎకరాకు తగినంత ఇసుకతో కలిపి చల్లాలి.
35	18-01-2018	జింక్ లోప నివారణకు 400 గ్రాముల జింక్ సల్ఫేట్ ను 5 రోజుల వ్యవధితో రెండు పర్యాయములు పిచికారీ చేయాలి. లేదా చీలేటెడ్ జింక్ ను 250 గ్రాముల చొప్పున 5 రోజుల వ్యవధితో రెండు పర్యాయములు పిచికారీ చేయాలి.
36	01-02-2018	ఆకు మచ్చ తెగులు మరియు జింక్ లోపము నివారణకు చీలేటెడ్ జింక్ 300 గ్రాములు మరియు సాఫ్ పొడి మందు 400 గ్రాములు కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
37	11-02-2018	ఆకు మచ్చ తెగులు మరియు జింక్ లోపము నివారణకు చీలేటెడ్ జింక్ 300 గ్రాములు మరియు సాఫ్ పొడి మందు 400 గ్రాములు కలిపి పిచికారీ చేయాలి
38	11-02-2018	పొలము గట్టపై కలుపుని నిర్మూలించాలి. ఒక అంగుళము మించకుండా నీరు పెట్టాలి.
39	11-02-2018	పై పాటుగా కాంప్లెక్స్ ఎరువులు వాడరాదు. కేవలము యూరియా ఎకరాకు 35-40 కిలోల మోతాదు మించకుండా బురద పడును లో చల్లాలి
40	28-02-2018	ముగి పురుగు నివారణకు కెల్టాన్ -4 G 8 కిలోలు లేదా FERTERA గుళికలు ఎకరాకు 4 కిలోలు పలుచగా నీరుంచి చల్లాలి .

District Pest Management Plan (DPMP)

		గట్లపై కలుపు మొక్కలను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలి
41	06-03-2018	అగ్గితెగులు నివారణకు భీమ్,సివిక్ @ 120గ్రామ్స్/ఎకరా పిచికారీ చేయాలి
42	06-03-2018	ఆకు మచ్చతెగులు నివారణకు సాఫ్ @ 400గ్రామ్స్/ఎకరా పిచికారీ చేయాలి
43	06-03-2018	జింక్ లోపం ఉన్నట్లయితే నివారణకు 250-300గ్రామ్స్ /ఎకరా పిచికారీ చేయాలి
44	19-03-2018	అగ్గి తెగులు నివారణకు ట్రైసైక్లోసోల్ @ 0.6ml/lit, ఐసోప్రోతాయోరెన్ @ 1.5ml/lit, కాసుగామైసిన్ @ 2.5ml/lit నీటికి పిచికారి చేయాలి
45	19-03-2018	కంపు నల్లి నివారణకు క్లోరోపైరిఫాస్ @ 2.5ml/lit నీటికి పిచికారి చేయాలి
46	19-03-2018	పొట్ట దశలో కాండం తోలుచు పురుగు నివారణకు క్లోరాన్త్రానిలిప్రోల్ @ 0.3 ml/lit నీటికి పిచికారి చేయాలి

District Pest Management Plan (DPMP)

Cotton (2017-2018)

Sl.No.	Date of Dissemination	Message
1	19-05-2017	అనేక రకాలైన చీడపీడలను మరియు తెగుళ్ళను నివారించుకొనుటకు వేసవి లో లోతు దుక్కులు దున్నుకోవడం తప్పనిసరి
2	06-06-2017	ప్రత్తి పంటను జూన్ నెలలో ఎంత త్వరగా విత్తుకుంటే అంత మంచి దిగుబడులు వస్తాయి. వర్షాధారంగా ప్రత్తిని పండించు రైతులు కనీసం రెండు మంచి వర్షాలు అనగా 60 మి.మీ. వర్షపాతం పడిన తరువాత ప్రత్తిని విత్తుకుంటే మొలక శతం బాగా వచ్చి, పంట దిగుబడులు పెరుగుతాయి.
3	20-06-2017	రసం పీల్చే పురుగుల నివారణ కొరకు ప్రత్తి విత్తే ముందు చేను చుట్టూ రెండు లేక మూడు సాళ్ళలో ఒత్తుగా జొన్న లేదా మొక్కజొన్నని రక్షక పంటగా వేసుకోవాలి.
4	29-06-2017	ప్రత్తి విత్తినాక 48 గంటలలోపు లేదా 2 రోజుల లోపు భూమిలో తేమ ఉన్నప్పుడు కలుపు మొలవకుండా పెండిమిథాలిన్ (స్టాంప్) 5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలుపుకొని పిచికారి చేసుకున్నట్లైతే దాదాపు 30 నుండి 40 రోజుల వరకు కలుపు లేకుండా చూసుకోవచ్చు.
5	29-06-2017	తొలి దశలో పురుగు కనిపించిన వెంటనే విచ్చలవిడిగా రసాయన మందులు పిచికారి చేయరాదు.
6	29-06-2017	వీలైతే ప్రత్తి చుట్టూ 2-3 వరుసలలో ఒత్తుగా జొన్న పంటను రక్షక పంటగా విత్తుకోవాలి
7	19-07-2017	ప్రత్తి 20, 35 మరియు 60 రోజుల దశలో కాండమునకు మోనోక్రోటోఫాస్, నీరు 1:4 నిష్పత్తి లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్, నీరు 1:20 నిష్పత్తి లో కలిపి లేత ఆకు పచ్చ కాండము భాగమునకు పూసి రసం పీల్చు పురుగులను(పచ్చ దోమ, తెల్ల దోమ, పేను, తామర పురుగు) నియంత్రించాలి.
8	19-07-2017	ప్రత్తి లో వేరు కుళ్ళు తెగులును నివారించేందుకు ట్రికోడెర్మా విరిడి 10గా. లీటరు నీటికి కలిపి మొక్కల మొదళ్ళలో పోయాలి. లేదా 10 లీటర్ల నీటిలో 30 గ్రా. కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ మరియు 1గ్రా. ఫ్లైప్రోస్పెక్టిన 1గ్రా. చొప్పున కలిపి మొక్క మొదలులో పోయాలి.
9	19-07-2017	పైపాటుగా కాంప్లెక్స్ ఎరువులు కాకుండా యూరియా మరియు పొటాష్ ఎరువులను సిఫారసు చేసిన మోతాదు లో వాడాలి.

District Pest Management Plan (DPMP)

10	25-07-2017	పొలం గట్ల వెంట పెరిగే కలుపు మొక్కలను వెంటవెంటనే నివారించవలెను
11	25-07-2017	నేలలో సరైన తీమను చూసుకొని సిఫారసు చేసిన మోతాదులో యూరియ (30 కిలోలు) మరియు పొటాష్(10 కిలోలు) పైపాటుగా 4 విడతలలో వేయాలి
12	25-07-2017	బెట్ట(పొడి) వాతావరణంలో రసం పీల్చే పురుగుల ఉధృతి పెరుగుతుంది. ఆప్రమత్తంగా ఉండాలి
13	08-08-2017	బెట్ట పరిస్థితుల నుండి పైరుని కాపాడుకునేందుకు శీటరు నీటికి 5 గ్రాముల చొప్పున 13-0-45 లేదా శీటరుకు 10 గ్రాముల చొప్పున యూరియా కలిపి పిచికారి వేయాలి
14	08-08-2017	పేను నివారణకు శీటరు నీటికి 1.6 మి.లీ. మోనోక్రోటోఫాస్ లేదా 1.5 గ్రా. అసిఫేట్ కలిపి పిచికారి చేయాలి
15	16-08-2017	గులాబి రంగు కాయ తొలుచు పురుగు ఆశించినది. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎకరాకు 8 చొప్పున లింగాకర్షక బుట్టలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. బుట్టలో 8 కన్నా ఎక్కువ రెక్కల పురుగులు పడినట్లైతే సస్య రక్షణ చేపట్టాలి. ట్రైకోగ్రామ గుడ్డు పరాన్న జీవిని ఎకరాకు 20వేల చొప్పున వారమునకు ఒక పర్యాయము నాలుగు వారాలు విడుదల చేయాలి. దిగువ క్రిమి సంహారక మందులను మార్చి మార్చి వాడాలి. ప్రొఫెనోఫాస్ 400 మి. లీ./ఎకరాకు లేదా థయోడికార్బ్ 250గ్రా./ఎకరాకు. వాడాలి.
16	16-08-2017	జింకు లోపము ఉన్న ఎడల 400గ్రాముల జింకు సల్ఫేటు/ఎకరాకు వాడాలి
17	29-08-2017	ప్రత్తిలో పేను, పచ్చదోమ తామర పురుగుల నివారణకు ఎకరమునకు అసిటామాప్రిడ్ 50 గ్రాములు లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 60 మి.లీ. లేదా థయోమిథాక్సాం 50 గ్రాములు ఎకరానికి మార్చి మార్చి వాడాలి.
18	29-08-2017	తెల్ల దోమను నియంత్రించుటకు ఎకరాకు 20 పసుపు రంగు జిగురు ఆట్టలను చేనులో అక్కడక్కడ అమర్చాలి.
19	29-08-2017	తెల్లదోమ ఉధృతి అధికమైతే ట్రైఅజోఫాస్ ఎకరాకు 400 మి.లీ. పిచికారి చేయాలి
20	04-09-2017	పత్తి పంటలో తెల్ల దోమ నివారణకు ఎకరాకు 20 పసుపు రంగు జిగురు అట్టలను ఏర్పాటు చేయాలి. ట్రైఅజోఫాస్ 400 మి. లీ. ఎకరాకు పిచికారి చేయాలి.

District Pest Management Plan (DPMP)

21	25-10-2017	ఆకు మచ్చ తెగులు నివారణకు కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ 600 గ్రా.+ ప్లాంట్ మైసిన 50 గ్రా.కలిపి ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి
22	28-11-2017	గులాబీ రంగు పురుగు నిద్ర (ప్యూపా) దశలు నేలలో గడుపుతాయి . ఈ దశలో నీరున్న చోట తేలికపాటి తడి ఇవ్వాలి. దానివల్ల నిద్ర దశ పురుగులు ఊపిరి ఆడక చనిపోతాయి.
23	04-12-2017	పంటను పొడిగించవద్దు. పెసర లేక మొక్కజొన్న పంటలు వేయవచ్చు. పత్తి మోళ్లను shredder సాయం తో ముక్కలు గా చేయాలి. చెత్తను కుళ్లింప చేయు జీవన ఎరువును వాడాలి
24	28-12-2017	జిన్నింగ్ మిల్లుల చుట్టు ప్రక్కల పేరుకొని ఉన్న గుడ్డి పత్తి ,అవశేషాలు పూర్తిగా తొలగించి నశింప చేయాలి. పత్తి మోళ్లను shredder పరికరంతో ముక్కలుగా చేయాలి.
25	09-01-2018	పంటను పొడిగించ రాదు. మోళ్లను , పంట అవశేషాలను కాల్చి వేయాలి. నీటి సౌకర్యము ఉన్న చోట పెసర లేదా నువ్వు పంటలను విత్తుకోవాలి.
26	19-01-2018	పంటను పొడిగించ రాదు. మోళ్లను, అవశేషాలను కాల్చి వేయాలి. లేదా రోటేటర్ లేదా shredder తో కలియ దున్నాలి.
27	19-01-2018	పంట అవశేషాలను వేస్ట్ డీకంపోజర్ వాడి సేంద్రియ ఎరువుగా మార్చుకోవచ్చు.
28	31-01-2018	పత్తి పొరక,/కట్టను ముక్కలుగా చేసి వేస్ట్ డీకంపోజర్ (waste decomposer)తో సేంద్రియ ఎరువుగా మార్చాలి. పంటను పొడిగించరాదు.
29	06-03-2018	పంటను కొనసాగించరాదు, మోళ్లను shredder తో ముక్కలుగా కత్తిరించాలి.
30	26-03-2018	పొరుకను ముక్కలుగా చేసి నేలలో కలియదున్నాలి. అనుమతిలేని బిజీ -3 పత్తి విత్తనాలను కొనుగోలు చేయరాదు.

District Pest Management Plan (DPMP)

Chilli (2017-2018)

Sl.No.	Date of Dissemination	Message
1	19-05-2017	అనేక రకాలైన చీడపీడలను మరియు తెగుళ్ళను నివారించుకొనుటకు వేసవి లో లోతు దుక్కులు దున్నుకోవడం తప్పనిసరి.
2	08-08-2017	ప్రధాన పొలమునకు ఎకరాకు 20 బండ్లకు తగ్గకుండా పశువుల ఎరువును తోలించి భూమిలో కలియదున్నాలి.
3	08-08-2017	నారు మడిని మారుడు తెగులు నుండి కాపాడుటకు 30 గ్రా. కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ + 1 గ్రాము స్ట్రెప్టోస్టెక్స్ 10 లీటర్ల నీటికి కలిపి నారుమడి పూర్తిగా తడిచేలా పిచికారి వేయాలి
4	08-08-2017	తామర పురుగుల నివారణకు ఫిప్రోనిల్ గుళికలు సెంటు నారుమడికి 80 గ్రాముల చొప్పున వాడాలి
5	14-08-2017	మిరప నారు కట్టలను సూడోమొనాస్ ద్రావణములో (10మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి) 20 నిమిషములు శుద్ధి చేసి నాటవలెను.బాగా పెరిగిన నారు తలలు తొంచి నాటుట వలన తామర పురుగుల తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు
6	14-08-2017	మిరపలో బాగా చివికిన పశువుల ఎరువును (ఎకరానికి 20 బండ్లు) మరియు 200 కిలోల వేప పిండి వాడాలి
7	21-08-2017	ఆరోగ్యకరమైన నారు మొక్కలను కుదురుకు రెండు, మూడుకు మించకుండా నాటుకోవాలి
8	21-08-2017	మిరప నారు నాటేముందు నారు మొక్కల వేర్లను శీలీంధ్ర నాశక ద్రావణములో 20 నిమిషాలు ఉంచి నాటుకోవాలి. (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ 30 గ్రాములు+స్ట్రెప్టోస్టెక్స్ 1గ్రాము 10 లీటర్ల నీటికి చొప్పున లేదా సూడోమొనాస్ 50 మి.లీ. 10 లీటర్ల నీటికి చొప్పున)
9	21-08-2017	మిరప నారు దశలో తామర పురుగుల నియంత్రణకు ఫిప్రోనిల్ 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి
10	04-09-2017	మిరపలో వేరు పురుగు నియంత్రణకు 200కిలోల వేపపిండి వాడాలి. మెటారైజియం 2కిలోలు పశువుల ఎరువులో కలిపి వేయాలి
11	04-09-2017	తామర పురుగుల నియంత్రణకు ఫిప్రోనిల్ 2మి.లీ. నీటిలి కలిపి వాడాలి
12	14-09-2017	పై ముడత నివారణకు 2 మి. లీ. ఫిప్రోనిల్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
13	14-09-2017	వేరు పురుగు నివారణకు 200 కిలోల వేప పిండి ఎకరాకు వాడాలి

District Pest Management Plan (DPMP)

		మరియు 5 కిలోల ఫోరట్ 10జి గుళికలు ఎకరాకు వాడాలి.
14	16-10-2017	పై ముడత నివారణకు వేప నూనె (1 లీటరు) + ఫిప్రోనిల్ (400 మి.లీ.) కలిపి ఆకుల అడుగు తడిచే విధంగా పిచికారి చేయాలి.
15	25-10-2017	పైపాటుగా నీటి తడిని ఇచ్చినప్పుడు ఎకరానికి 50 కేజీల యూరియా + 25 కేజీల మ్యూరట్ ఆఫ్ పొటాష్ + 50 కేజీల వేప పిండి కలిపి వేయవలెను
16	07-11-2017	వడలు మరియు ఎండు తెగులు ఆశించినది. రాగి ధాతు శిలింధ్రనాశకాలను (బ్లయిటాక్స్) 3 గ్రాములు లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి మొదళ్ళు బాగా తడపాలి
17	14-11-2017	మిరప:- గండు పూత పురుగు నోకుతోంది. వేప నూనె ఒక లీటర్ ఎకరాకు పిచికారి చేయాలి. ఎక్కువగా సస్య రక్షణ మందులు వాడ వద్దు.
18	21-11-2017	వేరు భాగములో అధిక తేమ నిల్వ కుండా చూడాలి, తెల్ల నల్లి ఆశించినది అదుపులో ఉంచుటకు స్పెర్మెసిఫెన్ పావు లీటరు ఎకరాకు పిచికారి చేయాలి. రసము పీల్చు పురుగుల వల్ల వైరస్ తెగుళ్లు వ్యాపిస్తాయి. కావున ఈ రసము పీల్చు పురుగులను అదుపు చేయాలి.
19	04-12-2017	లద్దె పురుగు నివారణకు నోవల్యూరాన్ 200 మి.లీ. ఎకరాకు వాడాలి. మంగు మరియు తెల్లమల్లి నివారణకు స్పెర్మెసిఫెన్ 200 మి.లీ. ఎకరాకు వాడాలి. ఆకుమచ్చ మరియు బూడిద తెగులు నివారణకు ఏమిస్టర్ 150 మి.లీ వాడాలి. ప్రతిసారి మందులను మార్చి వాడుకోవాలి.
20	19-12-2017	కాయ కుళ్ళు మరియు తలమాడు అశించినది నివారణకు బ్లెయిటాక్స్ 750 ప్లాంటమెసిన్ 50 గ్రాములు కలిపి పిచికారి చేయాలి.
21	27-12-2017	నీరు అధికంగా పారించరాదు. బూడిద తెగులు నివారణకు కాంటాప్ 400 మి.లీ ఎకరాకు పిచికారి చేయాలి.
22	10-01-2018	తొలిదశ లద్దె పురుగుల నివారణకు వేపనూనె 5 మి .లీ. + క్లోరిపైరిఫోస్ 2.5 మి .లీ. లీటర్ నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి.
23	19-01-2018	తల మాడు మరియు కాయ కుళ్ళు నివారణకు అమిస్టర్ 250 మి. లీ. లేదా కాబ్రియోటాప్- 600 గ్రాములు లేదా నాటివో 160 గ్రాములు ఎకరాకు వాడాలి
24	19-01-2018	బూడిద తెగులు నివారణకు అమిస్టర్ 250 మి.లీ. లేదా ఇండెక్స్ 150

District Pest Management Plan (DPMP)

		గ్రాములు ఎకరాకు వాడాలి
25	25-01-2018	గండు పూత/ గొట్టే కాయలు నివారణకు Triaziphos ఎకరాకు 400 మి.లీ. పిచికారీ చేయాలి.
26	25-01-2018	కాయ తొలుచు పురుగుల నివారణకు విషపు ఎరను (10 కిలోల తవుడు + 2 కిలోల తవుడు + ఒక లీటర్ మోనోక్రోటోఫాస్) సాయంత్రపు వేళల్లో పొలం లో సమం గా చల్లాలి
27	31-01-2018	పొగమల్లే పరాన్నజీవి కలుపు మొక్క నివారణకు 400 మి.లీ. పరక్వాట్ 24% ద్రావకం 200lt ల నీటిలో కలిపి మల్లె మీద మాత్రమే పడేటట్టు నాజల్ కు డోముపెట్టి పిచికారి చేయాలి.
28	31-01-2018	వేరు వ్యవస్థ లో అధిక తేమ ను నిలువకుండా చూడాలి. కొమ్మ ఎండు తెగులు కాయ కుళ్ళు తెగులు నివారణకు కాబ్రియాటాప్ 600 గ్రాములు ఎకరాకు పిచికారీ చేయాలి.
29	05-02-2018	తలమాడు మరియు కాయ కుళ్ళు తెగులు నివారణకు కస్టోడియం ఎకరాకు 250 మి.లీ. ఎకరాకు పిచికారీ చేయాలి.
30	28-02-2018	ఏక రీతిగా పండిన కాయలను విడతల వారీగా కోయాలి. మార్కెట్ లో మంచి ధర పలుకుటకు గ్రేడింగ్ చేయాలి కోతలకు ముందు పురుగు మందులను పిచికారీ చేయ రాదు.
31	06-03-2018	తెగుళ్ళుసోకని మొక్కల నుండి దృఢమైన కాయలను ఎంచుకొని విత్తనాలను సేకరించాలి.
32	06-03-2018	కాయ కుళ్ళు తెగులు నివారణకు అజ్ క్సీస్ట్రోబిన్ (అమిస్టర్) 200 మి. లీ. ఎకరాకు పిచికారీ చెయాలి.
33	19-03-2018	కాయకుళ్ళు తెగుళ్ళ నివారణకు మాంకోజెబ్ 3 గ్రా./లీ., ఫ్లాంతోమైసిన్ @ 2 గ్రా./లీ. పిచికారి చేయాలి.
34	19-03-2018	కాయతొలుచు పురుగు నివారణకు స్ప్రెనెండ్ 0.5/గ్రా ఎమమెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.3 గ్రా./లీ. పిచికారి చెయాలి.
35	26-03-2018	ఏకరీతిగా పండిన ఆరోగ్యమైన కాయలను తెగులు సోకని మొక్కలనుండి విత్తనముగా సేకరించుకోవాలి. మార్కెట్ లో మంచి ధర పొందుటకు కాయలను గ్రేడింగ్ చేయాలి.